

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。（こちらに掲載している内容は、2025年2月現在の内容です）

## [適用表]

### [適用病害虫と使用方法]

作物名	適用病害虫名	使用時期※	総使用回数※			
			本剤のみ	フルベンジアミド	フロニカミド	ピラジフルミド
花き類・ 観葉植物	アブラムシ類 ハスモンヨトウ コナジラミ類(パンジー) ミカンキロアザミウマ(ばら)	発生前～発生初期	3回	4回	6回	3回
	うどんこ病(ばら) 黒星病(ばら)	発病前～発病初期				
きゅうり	アブラムシ類 うどんこ病 褐斑病	収穫前日	3回	3回	3回	3回
トマト ミニトマト	アブラムシ類 オオタバコガ コナジラミ類		2回	2回		
なす	アブラムシ類 うどんこ病	収穫前日	3回	3回	2回	3回(灌注 は1回)
ピーマン	アブラムシ類 オオタバコガ			2回		
はくさい	アオムシ	2回		4回(灌注は1回、 散布及び無人航空機 散布は合計3回)	2回	3回(灌注 は1回)
キャベツ	アオムシ コナガ ウワバ類					
ブロッコリー	ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ	収穫7日前		3回(灌注は1回、 散布及び無人航空機 散布は合計2回)	2回	3回
レタス	アブラムシ類 ハスモンヨトウ					
非結球レタス	ア布拉ムシ類 ハスモンヨトウ	2回		2回	3回(灌注 は1回)	3回
ねぎ	さび病		3回	3回		
えだまめ	アブラムシ類	収穫前日			2回	3回
さやえんどう	ア布拉ムシ類			2回		
あずき	アブラムシ類	収穫7日前		3回	2回	3回
にがうり	アブラムシ類					
メロン	アブラムシ類 コナジラミ類	収穫前日			3回	2回
すいか	ア布拉ムシ類					
いちご	うどんこ病	2回			2回	3回
かんきつ (みかんを除く)	ケムシ類 アゲハ類	収穫14日前				
みかん	ケムシ類 アゲハ類	収穫7日前			3回	2回
りんご	ア布拉ムシ類 黒星病	収穫14日前				
なし	ケムシ類	開花前			3回(樹幹散布は 1回、散布は2回)	2回
ぶどう	ケムシ類					
すもも	ケムシ類	収穫7日前			6回	6回
樹木類	ケムシ類	発生前～発生初期	6回	6回		

※印は使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

## 薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

### 薬剤の使用に関する注意事項