

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。（こちらに掲載している内容は、2023年1月現在の内容です）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
トマト、ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類	5g/株	定植時	1回	植穴土壤混和	5回以内 (培土混和および灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壤混和は1回以内、散布および定植後の株元散布は合計2回以内)
			生育期但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布	
ナス	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	5g/株	定植時	1回	植穴土壤混和	3回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壤混和は合計1回以内、散布および定植後の株元散布は合計2回以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類		生育期但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布	
ピーマン	アブラムシ類	5g/株	定植時	1回	植穴土壤混和	4回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壤混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
			生育期但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布	
キュウリ	アブラムシ類 コナジラミ類	5g/株	定植時	1回	植穴土壤混和	4回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壤混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
			生育期但し、収穫開始14日前まで	1回	株元散布	
イチゴ	ワタアブラムシ	5g/株	定植時	1回	植穴土壤混和	1回
花き類・観葉植物	アブラムシ類	5g/株	定植時	1回	植穴土壤混和	5回以内 (土壤混和は1回以内)
		100g/m ³	生育期	5回以内	株元散布	

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

薬剤の使用に関する注意事項