

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。
(こちらに掲載している内容は、2023年8月現在の内容です)

適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用時期	総使用回数※	
			本剤	クロチアニジン
だいこん	アブラムシ類	収穫7日前まで	2回以内	3回以内(は種時の土壤混和は1回以内、は種後は2回以内)
かぶ		収穫3日前まで	3回以内	4回以内(は種時の土壤混和は1回以内、散布は3回以内)
キャベツ	アオムシ、コナガ		2回以内	3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)
ねぎ	ネギアザミウマ		4回以内	4回以内(定植時までの処理は1回以内)
にら			3回以内	3回以内
わけぎ、あさつき			4回以内	4回以内
しゅんぎく、こまつな	アブラムシ類		3回以内	4回以内(は種時の土壤混和は1回以内、散布は3回以内)
みつば				3回以内
チンゲンサイ		収穫7日前まで		4回以内(は種時及び定植時の土壤混和は合計1回以内、散布は3回以内)
みずな	ダイコンハムシ			4回以内(は種時の土壤混和は1回以内、散布は3回以内)
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、なばな類*、みずなを除く)	アブラムシ類			3回以内
非結球レタス	アオムシ	収穫3日前まで	2回以内	5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内)
はくさい			3回以内	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
ブロッコリー				4回以内(は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内)
えだまめ	アブラムシ類、カメムシ類			3回以内
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)	ア布拉ムシ類			4回以内(は種時の土壤混和は1回以内、散布は3回以内)
だいす	カメムシ類	収穫7日前まで		4回以内(は種時の土壤混和は1回以内、散布は3回以内)
きゅうり	ア布拉ムシ類、コナジラミ類、ウリハムシ	収穫前日まで		4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壤混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
なす	ア布拉ムシ類、ハモグリバエ類			
トマト、ミニトマト	ア布拉ムシ類			
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	2回以内		3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)

作物名	適用害虫名	使用時期	総使用回数※	
			本剤	クロチアニジン
とうがらし類、オクラ	アブラムシ類	収穫前日まで	3回以内	3回以内
にがうり	ミナミキイロアザミウマ			4回以内(定植時の土壤混和は1回以内、散布は3回以内)
すいか	アブラムシ類	収穫3日前まで		
かぼちゃ				3回以内
未成熟とうもろこし				4回以内(植付時の土壤混和は1回以内、植付後は3回以内)
ばれいしょ	テントウムシダマシ類	収穫7日前まで		3回以内
うめ	アブラムシ類	収穫3日前まで		
いちじく	カミキリムシ類			
かき	カキノヘタムシガ	収穫7日前まで		
かんきつ	アブラムシ類、ミカンハモグリガ	収穫前日まで		6回以内(樹幹散布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
りんご	ケムシ類			3回以内
ぶどう	コナカイガラムシ類			
ブルーベリー	ケムシ類	収穫45日前まで		
キウイフルーツ	カメムシ類	収穫前日まで		
もも	アブラムシ類、コガネムシ類	収穫7日前まで		
ネクタリン	ア布拉ムシ類、コガネムシ類	収穫3日前まで		
おうとう	カメムシ類	収穫前日まで	2回以内	2回以内
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ			
ガーベラ、カトレア	ア布拉ムシ類	-	6回以内	6回以内
花き類・観葉植物(ガーベラ、カトレアを除く)			4回以内	4回以内

●希釈倍数:原液 ●使用方法:散布

*「なばな類(茎葉及び花蕾を収穫するもの)」には「太田かぶ」が含まれます。

- 2013年8月7日付:きゅうりの変更、にがうり、ねぎ、もも、ブルーベリー、オリーブの追加
- 2014年6月25日付:キャベツ、ピーマン、ねぎ、かんきつの変更
- 2014年7月9日付:かぼちゃ、すいか、にら、非結球レタス、いちじく、おうとう、りんごの追加。えだまめの変更
- 2015年1月21日付:にがうり、ブロックリーの変更
- 2015年5月19日付:未成熟とうもろこし、かぶ、はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイを除く)、こまつな、チンゲンサイ、とうがらし類、オクラ、豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)、しゅんぎく、わけぎ、あさつき、みつば、キウイフルーツ、ネクタリンの追加
- 2021年2月10日付:非結球レタス、はくさい、えだまめ、非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、なばな類、みずなを除く)の変更、みずなの追加
- 2021年8月25日付:かんきつの変更

効果・薬害等の注意

- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましい。

安全使用上の注意

- 体調のすぐれない時は散布しない。
 - 人に向かって噴射しない。
 - 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)。
 - 風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意。
 - ミツバチ及び蚕に対して影響があるので、注意して使用する。
 - 使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理する。
- 「は種」とは、種をまくことです。「とう」はサクランボのことです。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)