

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2020年6月現在の内容です)

適用病害虫と使用方法

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用時期	使 用 方 法	総使用回数※			
					本剤	クロチアニジン	フェンプロ パトリン	メパニ ビリム
ばら	アブラムシ類、アザミウマ類、クロケシツブチョッキリ、コガネムシ類成虫、コナジラミ類、チュウレンジハバチ、ハダニ類、ハモグリバエ類、ハスマンヨトウ、ゴマダラカミキリ成虫	原液	発生初期	散布	4回以内	4回以内	6回以内	5回以内
	うどんこ病、黒星病、灰色かび病							
花き類・観葉植物 (ばら、花月を除く)	アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハモグリバエ類、ハスマンヨトウ		発生初期					
	うどんこ病、灰色かび病							
花月	アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハモグリバエ類、ハスマンヨトウ、ミカンコナカイガラムシ		発生初期					
	アブラムシ類、ツツジゲンバイ、カイガラムシ類、ケムシ類							
つつじ類	うどんこ病		発生初期				5回 以内	6回以内
	アブラムシ類、ヘリグロテントウノミハムシ、カイガラムシ類、ケムシ類							
まさき	アブラムシ類、オバハゴロモ、カイガラムシ類、ケムシ類		発生初期					
	うどんこ病							
樹木類(つつじ類、 ひいらぎもくせい、 まさきを除く)	アブラムシ類、カイガラムシ類、ケムシ類		発生初期					
	アブラムシ類、ハモグリバエ類、コナジラミ類、灰色かび病							
ミニトマト	アブラムシ類、ハモグリバエ類、コナジラミ類、灰色かび病		収穫前日 まで		1回	4回以内 (育苗期の株元 処理及び定植時 の土壤混和は合 計1回以内、散布 及び定植後の株 元散布は合計3 回以内)	1回	4回以 内
トマト								
なす	アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハモグリバエ類、うどん こ病、灰色かび病							
きゅうり	ア布拉ムシ類、コナジラミ類、うどんこ病、褐斑病				3回 以内	3回以内	5回以内	

効果・薬害等の注意

- 使用に当たっては容器を良く振ってください(沈殿)。
- ぼけには使用はさけてください(薬害)。
- 花き類に使用する場合、花弁に薬液が飛散するとシミ等の症状が出るおそれがあるので、花にかかるないように注意してください。
- ツノロウムシの防除に使用する場合は、虫令が進むと効果が劣るので若令幼虫を対象にしてください。
- おうとうにはかかるないように注意してください(薬害)。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

注:上記の「おうとう」はサクランボのことです。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

薬剤の使用に関する注意事項