

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。  
最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。  
(こちらに掲載している内容は、2020年5月現在の内容です)

## 適用雑草と使用方法

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬を年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示します。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数※	使用方法	本剤700gで散布できる面積
日本芝 (こうらいしば)	一年生雑草	雑草発生前～ 雑草発生初期	20～40g/平方メートル	本剤:3回以内 シアナジン:3回以内 DBN:3回以内	全面土壌散布	17.5～35平方メートル (約5.4～10.6坪)
	多年生広葉雑草、 スギナ	春夏期 雑草発生前～ 雑草発生初期				

### 上手な散布の仕方

- 容器を開栓し、そのまま芝生に均一に散布します。
- 散粒口を真下に向け、中身を振り出すように容器を20～30cm上下させて70回振ると約20～40g出ます。
- 適量を均一に散布しやすいよう、容器の振り出し口はやや小さめになっています。
- 散布量過多に注意してください。

### 効果・薬害等の注意

- 雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、雑草発生前～雑草発生初期に均一に散布。
- 高温期や異常乾燥時または芝生が弱っている時には使用しない(薬害)。
- 砂土では使用しない(薬害)。
- 植え付け後や更新作業後の根が傷んでいる時期には使用しない(薬害)。
- 西洋芝は枯れるので、使用しない。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意。

## 薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

### 薬剤の使用に関する注意事項