

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。  
最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。  
(こちらに掲載している内容は、2025年4月現在の内容です)

## サンボルドー

有効成分：塩基性塩化銅…73.5%

(銅として…44.0%)

農林水産省登録 第 13768 号

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釀倍数	使用液量	使用時期	総 使用回数※	使 用 方 法
茶	もち病 赤焼病 炭そ病	500 倍		摘採 21 日 前まで		
きゅうり	斑点細菌病					
キャベツ だいこん	べと病	300～600 倍				
なす	褐色腐敗病	500 倍		-	-	散布
トマト ばれいしょ	疫病	300～600 倍				
かんきつ	そうか病					
	かいよう病	800 倍				
ぶどう	べと病	600 倍				
てんさい	褐斑病	300～600 倍				

- 2007 年 8 月 15 日付：なす、茶の変更

### ●効果・薬害等の注意

- ①茶に使用する場合は、摘採 21 日以前に散布を終えてください。
- ②本剤は無機の銅剤であるため、きゅうりに対して薬害を生じやすいので下記の事項に十分注意してください。
  - 幼苗期は特に発生しやすいので、中期以降に散布してください。
  - 高温時の散布は症状が激しくなることがありますのでさけてください。

●連続散布すると葉の周辺が黄化したり、硬化することがありますので過度の連用はさけてください。

●炭酸カルシウム剤の所定量の添加（200倍）は薬害軽減に有効ですが、収穫間際では果実に汚れを生ずるので留意してください。

③キャベツに使用する場合、薬害を生ずることがありますので下記の事項に注意してください。

●特に、結球開始期以降の散布では結球部に薬害を生じやすいので注意してください。

●炭酸カルシウム剤の所定量の添加（100倍）は、薬害軽減に有効です。

④かんきつ及びぶどうに使用する場合は、薬害（かんきつ：スタメラノーズ、ぶどう：黄変）の発生を防止するために炭酸カルシウム水和剤を加用（200倍）してください。特にかんきつの果実の着生時期の散布には注意してください。

⑤石灰硫黄合剤、マシン油乳剤、有機硫黄剤、有機ひ素剤などとの混用はさけてください。

⑥薬剤調製後、長期間放置しますと沈澱しますので、散布の時はよく攪拌してください。

## ●安全使用上の注意

①誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。

②粉末は眼に対して強い刺激性がありますので、散布液調製時には保護メガネを着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。

③散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

④蚕に対して影響がありますので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。

⑤使用残りの薬液が生じないように調製を行い使いきってください。

魚毒性：

●水産動植物（魚類、甲殻類、藻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。

## 薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

### 薬剤の使用に関する注意事項