

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2025年4月現在の内容です)

## パンチョ TF 顆粒水和剤

有効成分：シフルフェナミド…3.4%

トリフルミゾール…15.0%

農林水産省登録 第 21117 号

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害名	希釀倍数	使用液量	使用時期 ※	総使用回数※						
					本剤	シフルフェ ナミド	トリフルミゾ ール				
きゅうり、さやえんどう、トマト、ミニトマト、いちご、なす、すいか、メロン、ピーマン、うり類(漬物用)	うどんこ病	2,000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	2回	5回	5回				
かぼちゃ							5回(種子粉 衣は1回)				
にがうり		4,000 倍					3回				
ズッキーニ							4回				
りんご	灰星病	2,000 倍	200～700 L/10a	収穫 7 日 前まで	2回	3回	3回				
とうとう							2回				
麦類		2,000 倍	60～150 L/10a	収穫 14 日前まで			3回(種子粉 衣は1回)				
花き類・観葉植物							5回				
まさき、さるすべり	うどんこ病	100～300 L/10a	-	-		5回	2回				
							2回				

使用方法：散布

・2024年3月4日付：さやえんどうの追加

### ●効果・薬害等の注意

①うり類の幼苗期には、濃緑化症状および生育抑制が生ずることがあるので使用しないでください。

- ②過度の連用は避け、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください(薬剤耐性菌出現回避)。
- ③本剤は顆粒がかたまりになって溶けにくくなる場合があるので薬液調製の際はよく攪拌してください。かたまつた本剤を希釀して使用しても品質及び効果に問題ありません。
- ④適用作物群に属する作物又はその新品種に使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してください。使用方法等を厳守してください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましいです。

### **●安全使用上の注意**

- ①体調のすぐれない時は散布しないでください。
- ②眼に入らないように注意。眼に入った場合は、直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)。使用後は洗眼してください。
- ③かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
- ④桑葉にかかるないように注意してください(蚕毒)。
- ⑤散布中や、散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮してください。
- ⑥使用後の空袋は良くたたいて中身を完全に出してから処理してください。

## **薬剤の使用に関する注意事項**

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

### [\*\*薬剤の使用に関する注意事項\*\*](#)