

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2025年4月現在の内容です)

ベニカグリーンVスプレー

有効成分：フェンプロパトリン…0.010%

ミクロブタニル…0.0025%

農林水産省登録 第22009号

※印は収穫物への残留回避ため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釀倍数 | 使 用 時期 | 総使用回数※ | 使 用 方法 | |
|---|-------------|------|-------------------|---|--------|--|
| トマト | アブラムシ類、葉かび病 | 原液 | 収 穫 前 日 ま で | 3回以内 | 散布 | |
| ミニトマト | | | | 本剤：1回 フェンプロパトリン：1回 ミクロブタニル：3回以内 | | |
| きゅうり | | | | 5回以内 | | |
| なす | | | | 本剤：4回以内 フェンプロパトリン：5回以内 ミクロブタニル：4回以内 | | |
| いちご | | | | 3回以内 | | |
| ばら | | | - | 本剤：5回以内 フェンプロパトリン：6回以内 ミクロブタニル：5回以内 | | |
| きく | | | | | | |
| はぼたん | | | | | | |
| マリーゴールド | | | | | | |
| カーネーション | | | | | | |
| 花き類・観葉植物 (ばら、きく、はぼ たん、マリーゴー ルド、カーネーシ ョンを除く) | アブラムシ類、葉かび病 | | | | | |

| | | | | |
|------|--------------|--|--|--|
| つばき類 | チャドクガ、ツノロウムシ | | | |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | | | |
| さくら | アメリカシロヒトリ | | | |

- 2010年10月27日付：つばき類他変更。
- 2018年9月12日付：ミニトマトの追加。

●効果・薬害等の注意

- 使用に当っては使用方法などを誤らないよう注意してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

●安全使用上の注意

マスクマーク

- 体調のすぐれない時は散布しないでください。
- 人に向かって噴射しないでください。
- 敷布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。
- 本剤は、のど、鼻、皮ふなどを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意してください。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
- 皮ふに付着しないように注意。付着した場合には直ちに石けんで洗い落としてください（弱い刺激性）。
- 風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
- ミツバチ及び蚕に影響がありますので注意して使用してください。
- 街路、公園等で散布する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄張いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理してください。

保管：飲食物・食器類やペットの餌と区別し、直射日光をさけ、密閉して、小児の手の届かない冷涼な場所に横にしないで立てて保管。

治療法：フェンプロパトリンには、メトカルバモール製剤の投与が有効（動物実験で報告）。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

薬剤の使用に関する注意事項