

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2025年4月現在の内容です)

ベニカ J スプレー

有効成分：クロチアニジン…0.0080%

フェンプロパトリン…0.010%

農林水産省登録 第 23130 号

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釀倍数	使用時期	総使用回数※	使用方法
つつじ類	ケムシ類、ツツジグンバイ、カイガラムシ類	原液	発生初期	6回以内 本剤:4回以内 クロチアニジン:4回以内 フェンプロパトリン:6回以内	散布
かなめもち	ケムシ類、イラガ類、カイガラムシ類				
樹木類 (つつじ類、かなめもちを除く)	ケムシ類、カイガラムシ類				
ガーベラ	アブラムシ類、コナジラミ類				
カトレア	アブラムシ類				
ばら	アブラムシ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ				
きく	アブラムシ類、ハモグリバエ類				
カーネーション、ひまわり	アブラムシ類、ハダニ類				
ペチュニア、パンジー、ストック	ア布拉ムシ類、クロバネキノコバエ類				
花き類・観葉植物 (ばら、きく、ガーベラ、カトレア、カーネーション、ひまわり、ペチュニア、パンジー、ストックを除く)	アブラムシ類				

- 2013年9月11日付：つつじ類、つばき類の追加
- 2021年6月9日付：カーネーション、ひまわり、ペチュニア、パンジー、ストック、樹木類（つつじ類、かなめもちを除く）、つつじ類、かなめもちの変更

●効果・薬害等の注意

- 使用に当っては使用方法などを誤らないように注意。
- ぼけには使用は避けてください（薬害）。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。

●安全使用上の注意

- 体調のすぐれない時は散布しない。
- 人に向かって噴射しない。
- 本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
- 風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意。
- ミツバチ及び蚕に影響があるので、注意して使用する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に關係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
- 使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理する。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)