

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2025年4月現在の内容です)

ベニカベジフルスプレー

有効成分：クロチアニジン…0.0080%

農林水産省登録 第23121号

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用時期	総使用回数※	
			本剤	クロチアニジン
だいこん	アブラムシ類	収穫7日前まで	2回以内	3回以内(但し、は種時の土壤混和は1回以内、は種後は2回以内)
かぶ			3回以内	4回以内(但し、は種時の土壤混和は1回以内、散布は3回以内)
キャベツ			2回以内	3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)
ねぎ			4回以内	4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内)
にら	ネギアザミウマ	収穫3日前まで	3回以内	3回以内
わけぎ、あさつき			4回以内	4回以内
しゅんぎく、こまつな				4回以内(但し、は種時の土壤混和は1回以内、散布は3回以内)
みつば	アブラムシ類	3回以内		3回以内
チンゲンサイ				4回以内(但し、は種時及び定植時の土壤混和は合計1回以内、散布は3回以内)
みずな	ダイコンハムシ			4回以内(但し、は種時の土壤混和は1回以内、散布は3回以内)
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、なばな類*、みずなを除く)	アブラムシ類	収穫7日前まで		3回以内
非結球レタス			2回以内	5回以内(但し、定植時までの処理は1回

はくさい	アオムシ		以内、定植後の散布は 2 回以内、定植後の株元散布は 2 回以内)
ブロッコリー			4 回以内(但し、定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 3 回以内)
えだまめ	アブラムシ類、カメムシ類		4 回以内(但し、は種時の処理は 1 回以内、は種後は 3 回以内)
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)	アブラムシ類		3 回以内
だいす	カメムシ類	収穫 7 日前まで	4 回以内(但し、は種時の土壤混和は 1 回以内、散布は 3 回以内)
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類、ウリハムシ		
なす	アブラムシ類、ハモグリバエ類		4 回以内(但し、育苗期の株元処理及び定植時の土壤混和は合計 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 3 回以内)
トマト、ミニトマト	アブラムシ類		
ピーマン	ミナミキロアザミウマ	収穫前日まで	3 回以内(但し、定植時までの処理は 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 2 回以内)
とうがらし類、オクラ	アブラムシ類		3 回以内
にがうり	ミナミキロアザミウマ		
すいか			4 回以内(但し、定植時の土壤混和は 1 回以内、散布は 3 回以内)
かぼちゃ			
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	収穫 3 日前まで	3 回以内
ばれいしょ	テントウムシダマシ類	収穫 7 日前まで	4 回以内(但し、植付時の土壤混和は 1 回以内、植付後は 3 回以内)
うめ	アブラムシ類		
いちじく	カミキリムシ類	収穫 3 日前まで	3 回以内

かき	カキノヘタムシガ	収穫 7 日前まで		
かんきつ	アブラムシ類、ミカン ハモグリガ	収穫前日まで	6 回以内(但し、樹幹散布は 3 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 3 回以内)	
りんご	ケムシ類			
ぶどう	コカイガラムシ類			
ブルーベリー	ケムシ類	収穫 45 日前まで		
キウイフルーツ	カメムシ類	収穫前日まで		
もも	アブラムシ類、コガネ ムシ類	収穫 7 日前まで		
ネクタリン	アブラムシ類、コガネ ムシ類	収穫 3 日前まで		
おうとう	カメムシ類	収穫前日まで	2 回以内	2 回以内
オリーブ	オリーブ アナキゾウムシ			
ガーベラ、カトレア	アブラムシ類	-	6 回以内	6 回以内
花き類・観葉植物 (ガーベラ、カトレアを除く)			4 回以内	4 回以内

●希釈倍数：原液

●使用方法：散布

* 「なばな類（茎葉及び花蕾を収穫するもの）」には「太田かぶ」が含まれます。

●2013 年 8 月 7 日付：きゅうりの変更、にがうり、ねぎ、もも、ブルーベリー、オリーブの追加

●2014 年 6 月 25 日付：キャベツ、ピーマン、ねぎ、かんきつの変更

●2014 年 7 月 9 日付：かぼちゃ、すいか、にら、非結球レタス、いちじく、おうとう、りんごの追加。えだまめの変更

●2015 年 1 月 21 日付：にがうり、ブロッコリーの変更

●2015 年 5 月 19 日付：未成熟とうもろこし、かぶ、はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チングエンサイを除く)、こまつな、チングエンサイ、とうがらし類、オクラ、豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)、しゅんぎく、わけぎ、あさつき、みつば、キウイフルーツ、ネクタリンの追加

●2021 年 2 月 10 日付：非結球レタス、はくさい、えだまめ、非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チングエンサイ、なばな類、みずなを除く)の変更、みずなの追加

●2021 年 8 月 25 日付：かんきつの変更

●効果・薬害等の注意

- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましい。

●安全使用上の注意

- 体調のすぐれない時は散布しない。
- 人に向かって噴射しない。
- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)。
- 風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意。
- ミツバチ及び蚕に対して影響があるので、注意して使用する。
- 使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理する。
- 「は種」とは、種をまくことです。「おうとう」はサクランボのことです。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[**薬剤の使用に関する注意事項**](#)