

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。
(こちらに掲載している内容は、2025年4月現在の内容です)

ベニカ X スプレー

有効成分：ペルメトリン…0.010%

ミクロブタニル…0.0080%

農林水産省登録 第 20643 号

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用時期	総 使用回数※	使用方法
ばら	アブラムシ類、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病	原液	一	一	散布
きく	アブラムシ類、うどんこ病、白さび病				
サルビア	アブラムシ類、タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）、うどんこ病				
かなめもち	ごま色斑点病				
はなみずき	うどんこ病				
つばき類	チャドクガ				
花き類・観葉植物（ばら、きく、サルビアを除く）	アブラムシ類、うどんこ病				

- （2007年4月11日付：花き類・観葉植物（きく、ばら、サルビアを除く）の追加、サルビアの追加、きくの変更、ばらの変更）
- （2008年6月19日付：注意事項の追加）
- （2012年6月13日付：かなめもち、はなみずきの追加）

●効果・薬害等の注意

- ①重複散布や多量散布は注意してください（薬害）。
- ②適用作物群に属する作物又はその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用してください。なお、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

●安全使用上の注意

カイコ注意

- ①体調のすぐれない時は散布しないでください。
 - ②人に向かって噴射しないでください。
 - ③かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
 - ④風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
 - ⑤作業中や散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮してください。
 - ⑥蚕に長期間毒性があるので、付近に桑園があるところでは使用しないでください。
 - ⑦ミツバチに影響がありますので、注意して使用してください。
 - ⑧街路、公園等で使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札を立て、散布中及び散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
 - ⑨使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理してください。
- 治療法：ペルメトリンにはメトカルバモール製剤の投与が有効です（動物実験で報告）。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)