

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2023年4月現在の内容です)

スターガード(R)粒剤

種類名:ジノテフラン粒剤

【有効成分】ジノテフラン(化管法第1種)…1.0%

【性状】類白色細粒

【毒性】普通物※

【危険物】－

【有効年限・包装】5年・300g×30、800g×18

※普通物:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

特長

- ・ 有効成分が植物体内に速やかに浸透移行して、茎や葉に到達します。発見しづらく防除も難しい微小害虫や潜葉性害虫への対策に効果を発揮する殺虫剤です。
- ・ 多くの野菜に登録があり、マイナー作物・地域特産作物にも広範囲に対応していますので、使用者のニーズに幅広く対応できます。「花き類」「つづじ類」にも使えますので、ガーデニングにも重宝する殺虫剤です。
- ・ 人畜・魚類・鳥類に毒性が低い化合物です。また、作物への薬害も生じにくく、扱いやすい殺虫剤です。
- ・ アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類、コナガ・アオムシなど多くの害虫を、効率的に同時防除できます。
- ・ 多くの登録作物で、「定植時」と「生育期」の処理時期が選べます。

適用病害虫・使用方法

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジノテフラン※ | |
|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------|---|--|
| きゅうり | ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 2g/株 | 定植時 生育期但し、収穫開始14日前まで | 1回 | 植穴土壤混和 | 4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壤混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| | アブラムシ類 コナジラミ類 | 1~2g/株 1g/株 | | | 株元散布 | | |
| | | | | | | | |
| メロン | ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 2g/株 | 定植時 | | 植穴土壤混和 | 3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壤混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| | アブラムシ類 | 1g/株 | | | | | |
| | コナジラミ類 | 1~2g/株 | | | | | |
| すいか | ワタアブラムシ | 2g/株 | 生育期但し、収穫21日前まで | | 株元散布 | 4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壤混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| かぼちゃ | アブラムシ類 コナジラミ類 | | 定植時 | | 植穴土壤混和 | 3回以内 (定植時の土壤混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| なす | ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類 | 1~2g/株 | | | | 3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壤混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| | アブラムシ類 | 1g/株 | | | 生育期但し、収穫前日まで | 2回以内 | |
| | アブラムシ類 コナジラミ類 | | | | | 株元散布 | |
| トマト ミニトマト | ハモグリバエ類 コナジラミ類 | 1~2g/株 | 定植時 生育期但し、収穫前日まで | 1回 | 植穴土壤混和 | 5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壤混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| | アブラムシ類 | 1g/株 | | | | | |
| | アブラムシ類 コナジラミ類 | | | | | | |
| ピーマン | アザミウマ類 | 1~2g/株 | 定植時 生育期但し、収穫前日まで | 1回 | 植穴土壤混和 | 3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壤混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| | アブラムシ類 | 1g/株 | | | | | |
| | | | | | | | |
| とうがらし類 | アザミウマ類 | 1~2g/株 | 定植時 生育期但し、収穫開始14日前まで | 1回 | 植穴土壤混和 | 4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壤混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| | アブラムシ類 | 1g/株 | | | | | |
| | | | | | | | |
| キャベツ | | 2g/株 | 定植時 | | 株元散布 | | |
| | アオムシコナガ | 2~3g/株 | | | | | |
| | ハイマダラノメイガ | 3g/株 | | | | | |
| はくさい | アブラムシ類 | 2g/株 | | | 植穴土壤混和 | 3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壤混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |
| | アオムシコナガ | 2~3g/株 | | | | | |
| | ハイマダラノメイガ | 3g/株 | | | | | |
| プロッコリー | アブラムシ類 コナガ | 2g/株 | | | | 3回以内 (定植時の土壤混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |
| ねぎ | アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 6g/平方メートル | 生育期但し、収穫3日前まで | | 株元散布 | 4回以内 (は種時の土壤混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジノテフラン※ |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|---|--|--|
| にんじん | ハモグリバエ類 | 9g/平方メートル | は種時 | 1回 | 播溝土壤混和 | 4回以内 (は種時の土壤混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| だいこん | アブラムシ類 | 6g/平方メートル | 生育期但し、収穫30日前まで | 5回以内 (は種時の播溝土壤混和は1回以内、は種時の全面土壤混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | | |
| | キスジノミハムシ | 4~6g/平方メートル | | | 全面土壤混和 | |
| | | 9g/平方メートル | | | 散布 | |
| | | 6g/平方メートル | | | 土壤混和 | 3回以内 (は種時及び定植時の土壤混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
| チンゲンサイ | | アブラムシ類 キスジノミハムシ | 定植時 | 3回以内 (は種時の土壤混和は1回以内、散布は2回以内) | 播溝土壤混和 | |
| | | | は種時 | | | |
| 非結球あぶらな科 葉菜類 (チンゲンサイを除く) | | | | | | |
| かぶ | | | | | | |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | | | | | |
| だいす | フタスジヒメハムシ | | | | | 3回以内 (は種時の土壤混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) |
| しゅんぎく | ハモグリバエ類 | 9g/平方メートル | 定植時 | 播溝土壤混和 | 3回以内 (は種時及び定植時の土壤混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| | | | | | | |
| いちご | ワタアブラムシ | 0.5~1g/株 | | 植穴土壤混和 | 1回 | |
| オクラ | アブラムシ類 | 9g/平方メートル | 生育期但し、収穫開始14日前まで | | 3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| さやえんどう | ハモグリバエ類 | | | | | |
| きく ガーベラ | アブラムシ類 コナジラミ類 | 1g/株 (但し、1平方メートル当たり30gまで) | 定植時 | 植穴土壤混和 | 5回以内 (土壤混和は1回以内) | |
| | マメハモグリバエ | 2g/株 (但し、1平方メートル当たり30gまで) | | | | |
| | アブラムシ類 | 20g/平方メートル | | | 5回以内 | 株元散布 |
| 花き類・観葉植物 (きく、ガーベラを除く) | アブラムシ類 コナジラミ類 | 1g/株 (但し、1平方メートル当たり30gまで) | 定植時 | 1回 | 植穴土壤混和 | |
| | アブラムシ類 | 20g/平方メートル | 生育期 | 5回以内 | 株元散布 | |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 6g/平方メートル | 発生初期 | | | 5回以内 |
| えだまめ | フタスジヒメハムシ | | は種時 | 1回 | 播溝土壤混和 | 3回以内 (は種時の土壤混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) |
| レタス | アブラムシ類 ナモグリバエ | 2g/株 | 定植時 | 4回以内 (は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壤混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | 植穴土壤混和 | |
| しそ | マデイラコナカイガラムシ | 2g/株 (但し、1平方メートル当たり25gまで) | | | | 3回以内 (定植時の土壤混和は1回以内、散布は2回以内) |

※は有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

注意事項

使用上の注意

- (1) 間引き菜、つまみ菜に使用しないこと。
- (2) 本剤の株元散布を行う際は、処理直後に灌水すること。
- (3) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にからないようにすること。
- (4) ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にからないようにすること。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
 - ③ 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- (5) 作業中や散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮すること。
- (6) 容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- (7) 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。とくに適用作物群に属する作物又はその新品种に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

宅地、駐車場等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用方法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、食品と区別して、子供の手のとどかないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。また、他の容器に移し替えて保管しないこと。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

薬剤の使用に関する注意事項